

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（1サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病		1コース期間	21~28日間
総コース数	備考参照		プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスピソナ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day1.8.15
備考 ベスピソナ投与時、要遮光 HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（寛解 2~6サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病		1コース期間	28日間
総コース数	備考参照		プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスピソナ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day1.8.15
備考 ベスピソナ投与時、要遮光 HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（非寛解 2~6サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	28日間	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスピンサ	0.8mg/m2	div	60分以上かけて	day1
ベスピンサ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day8.15
備考 ベスピンサ投与時、要遮光 HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg以上）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	18μg/body	div	48時間	day1.3.5
ブリナツモマブ	18μg/body	div	24時間	day7
ブリナツモマブ	28μg/body	div	24時間	day8-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg未満）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	10μg/m2	div	48時間	day1.3.5
ブリナツモマブ	10μg/m2	div	24時間	day7
ブリナツモマブ	15μg/m2	div	24時間	day8-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（2~5サイクル目 45kg以上）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	28μg/body	div	24時間	day1-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（2~5サイクル目 45kg未満）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	15μg/m2	div	24時間	day1-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				