

レジメン名称	DCF			
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	術前 3コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	750mg/m ²	DIV	24時間	day1~5
ドセタキセル	70mg/m ²	DIV	60分	day1
シスプラチニ	70mg/m ²	DIV	120分	day1
備考				
day1~3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	DNF			
癌腫	食道癌		1コース期間	28日間
総コース数	術前 3コース		プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	600mg/m ²	DIV	24時間	day1~5
ドセタキセル	50mg/m ²	DIV	60分	day1
アクプラ	60mg/m ²	DIV	120分	day1
備考 day1~3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	FP			
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	800mg/m ²	DIV	24時間	day1~5
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
備考				
day0~3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	FP+ニボルマブ			
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	480mg/body	DIV	60分	day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	DIV	24時間	day1～5
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
備考 day0～3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	FP+ペムブロリズマブ			
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	DIV	24時間	day1～5
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
備考				
day0～3までハイドレーションあり。 7回目以降は、キイトルーダ+フルオロウラシルのみの維持療法へ変更。				

レジメン名称	mFOLFOX6			
癌腫	食道癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/m ²	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	70mg/m ²	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ（2週間毎）			
癌腫	食道癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジー ^ボ	240mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ (4週毎)			
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	480mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	パクリタキセル（毎週）			
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	100mg/m ²	DIV	60分	day1,8,15
備考	パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。			