

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髓異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10分	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髓異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10分	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髄異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10分	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髓異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10分	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髓異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	—	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髄異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	－
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	－	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髓異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	—	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髓異形成症候群		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	－
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	－	day1-7
備考				

レジメン名称 レナリドミド単独				
癌腫	5番染色体長腕部欠失を伴う骨髓異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	PD(増悪)まで	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レブラミド	10mg×1	経口	-	day1-21
備考 高脂肪食摂取後の投与によってAUC及びCmaxの低下が認められることから、高脂肪食摂取前後を避けて投与することが望ましい。3週間内服し7日間休薬。妊娠回避の徹底。				