

|          |                     |            |         |        |
|----------|---------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201寛解導入A         |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病            | 1コース期間     | 寛解で地固めへ |        |
| 総コース数    | -                   | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                     |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量               | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| イダルビシン   | 12mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 12時間    | day1-7 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 12時間    | day1-7 |
| 備考       |                     |            |         |        |

|          |                     |            |         |        |
|----------|---------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201寛解導入B         |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病            | 1コース期間     | 寛解で地固めへ |        |
| 総コース数    | -                   | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                     |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量               | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン  | 50mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 30分     | day1-5 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 12時間    | day1-7 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 12時間    | day1-7 |
| 備考       |                     |            |         |        |

|  |                       |            |         |        |
|--|-----------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201 地固め (HD-AraC)  |            |         |        |
| 癌腫   | 急性骨髄性白血病              | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数  | -                     | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容   |                       |            |         |        |
| 薬剤名  | 1日投与量                 | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 3時間     | day1-5 |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 3時間     | day1-5 |
|  |                       |            |         |        |
| 備考   |                       |            |         |        |
| 60歳以上で1500mg/m <sup>2</sup> へ減量。投与回数血球回復の期間により10回から8回へ変更可。<br>地固め療法は再発がなければ3回繰り返す。 |                       |            |         |        |

|  |                                 |            |                |        |
|--|---------------------------------|------------|----------------|--------|
| レジメン名称   | AML201 地固め (HD-AraC) 【ステロイド前処置】 |            |                |        |
| 癌腫   | 急性骨髄性白血病                        | 1コース期間     | -              |        |
| 総コース数  | -                               | プレメディケーション | グラニセトロン、ソルコーテフ |        |
| プロトコール内容   |                                 |            |                |        |
| 薬剤名  | 1日投与量                           | 投与方法       | 投与時間           | 投与日    |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup>           | DIV        | 3時間            | day1-5 |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup>           | DIV        | 3時間            | day1-5 |
| 備考   |                                 |            |                |        |
| 60歳以上で1500mg/m <sup>2</sup> へ減量。投与回数血球回復の期間により10回から8回へ変更可。<br>地固め療法は再発がなければ3回繰り返す。 |                                 |            |                |        |



|          |                          |            |         |        |
|----------|--------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201 地固め第 1 (MIT+AraC) |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                 | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                        | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                          |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                    | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン | 7mg/m2                   | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 100mg/m2                 | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m2                 | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                          |            |         |        |

|          |                         |            |         |        |
|----------|-------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201 地固め第2 (DNR+AraC) |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                       | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                         |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                   | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン  | 50mg/m2                 | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 100mg/m2                | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m2                | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                         |            |         |        |

|          |                         |            |         |        |
|----------|-------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | AML201 地固め第3 (ACR+AraC) |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                       | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                         |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                   | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アクリルピシン  | 20mg/m <sup>2</sup>     | DIV        | 30分     | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                         |            |         |        |

|                        |                           |            |         |        |
|------------------------|---------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称                 | AML201 地固め第4 (A-triple-V) |            |         |        |
| 癌腫                     | 急性骨髄性白血病                  | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数                  | -                         | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容               |                           |            |         |        |
| 薬剤名                    | 1日投与量                     | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| イトポシド                  | 100mg/m <sup>2</sup>      | DIV        | 2時間     | day1-5 |
| シタラビン                  | 100mg/m <sup>2</sup>      | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| シタラビン                  | 100mg/m <sup>2</sup>      | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| ビンクリスチン                | 0.8mg/m <sup>2</sup>      | IV         | 緩徐に     | day8   |
| ビンデシン                  | 2mg/m <sup>2</sup>        | IV         | 緩徐に     | day10  |
| 備考<br>ビンクリスチンmax : 2mg |                           |            |         |        |

|   |                                 |            |         |        |
|---|---------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称  | アザシチジン（点滴・5-HT3拮抗薬あり） + ベネトクラクス |            |         |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                        | 1コース期間     | 28日間    |        |
| 総コース数   | 期限なし                            | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容  |                                 |            |         |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                           | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アザシチジン  | 75mg/m <sup>2</sup>             | DIV        | 10分     | day1-7 |
| ベネトクラクス   | 100mg/day                       | p.o        | －       | day1   |
|   | 200mg/day                       | p.o        | －       | day2   |
|   | 400mg/day                       | p.o        | －       | day3-  |
| 備考  |                                 |            |         |        |
| ベネトクラクスは併用薬に応じて減量(強いCYP3A阻害薬1/8、中程度CYP3A阻害薬1/2)投与期間を短縮する場合もあり |                                 |            |         |        |

|   |                                 |            |      |        |
|---|---------------------------------|------------|------|--------|
| レジメン名称  | アザシチジン（点滴・5-HT3拮抗薬なし） + ベネトクラクス |            |      |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                        | 1コース期間     | 28日間 |        |
| 総コース数   | 期限なし                            | プレメディケーション | -    |        |
| プロトコール内容  |                                 |            |      |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                           | 投与方法       | 投与時間 | 投与日    |
| アザシチジン  | 75mg/m <sup>2</sup>             | DIV        | 10分  | day1-7 |
| ベネトクラクス   | 100mg/day                       | p.o        | -    | day1   |
|   | 200mg/day                       | p.o        | -    | day2   |
|   | 400mg/day                       | p.o        | -    | day3-  |
| 備考<br>ベネトクラクスは併用薬に応じて減量(強いCYP3A阻害薬1/8、中程度CYP3A阻害薬1/2)投与期間を短縮する場合もあり |                                 |            |      |        |

|          |                             |            |         |        |
|----------|-----------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり） |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                    | 1コース期間     | 28日間    |        |
| 総コース数    | 期限なし                        | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                             |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                       | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>         | DIV        | 10分     | day1-7 |
|          |                             |            |         |        |
|          |                             |            |         |        |
| 備考       |                             |            |         |        |

|          |                             |            |      |        |
|----------|-----------------------------|------------|------|--------|
| レジメン名称   | アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし） |            |      |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                    | 1コース期間     | 28日間 |        |
| 総コース数    | 期限なし                        | プレメディケーション | -    |        |
| プロトコール内容 |                             |            |      |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                       | 投与方法       | 投与時間 | 投与日    |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>         | DIV        | 10分  | day1-7 |
|          |                             |            |      |        |
|          |                             |            |      |        |
|          |                             |            |      |        |
| 備考       |                             |            |      |        |



|   |                                  |            |         |        |
|---|----------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称  | アザシチジン（皮下注・5-HT3拮抗薬あり） + ベネトクラクス |            |         |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                         | 1コース期間     | 28日間    |        |
| 総コース数   | 期限なし                             | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容  |                                  |            |         |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                            | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アザシチジン  | 75mg/m <sup>2</sup>              | s.c        | －       | day1-7 |
| ベネトクラクス   | 100mg/day                        | p.o        | －       | day1   |
|   | 200mg/day                        | p.o        | －       | day2   |
|   | 400mg/day                        | p.o        | －       | day3-  |
| 備考<br>ベネトクラクスは併用薬に応じて減量(強いCYP3A阻害薬1/8、中程度CYP3A阻害薬1/2)投与期間を短縮する場合もあり |                                  |            |         |        |

|   |                                  |            |      |        |
|---|----------------------------------|------------|------|--------|
| レジメン名称  | アザシチジン（皮下注・5-HT3拮抗薬なし） + ベネトクラクス |            |      |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                         | 1コース期間     | 28日間 |        |
| 総コース数   | 期限なし                             | プレメディケーション | -    |        |
| プロトコール内容  |                                  |            |      |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                            | 投与方法       | 投与時間 | 投与日    |
| アザシチジン  | 75mg/m <sup>2</sup>              | s.c        | -    | day1-7 |
| ベネトクラクス   | 100mg/day                        | p.o        | -    | day1   |
|   | 200mg/day                        | p.o        | -    | day2   |
|   | 400mg/day                        | p.o        | -    | day3-  |
| 備考<br>ベネトクラクスは併用薬に応じて減量(強いCYP3A阻害薬1/8、中程度CYP3A阻害薬1/2)投与期間を短縮する場合もあり |                                  |            |      |        |

|          |                              |            |         |        |
|----------|------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり） |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                     | 1コース期間     | 28日間    |        |
| 総コース数    | 期限なし                         | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                              |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                        | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>          | s.c        | —       | day1-7 |
|          |                              |            |         |        |
|          |                              |            |         |        |
| 備考       |                              |            |         |        |

|          |                              |            |      |        |
|----------|------------------------------|------------|------|--------|
| レジメン名称   | アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし） |            |      |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                     | 1コース期間     | 28日間 |        |
| 総コース数    | 期限なし                         | プレメディケーション | -    |        |
| プロトコール内容 |                              |            |      |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                        | 投与方法       | 投与時間 | 投与日    |
| アザシチジン   | 75mg/m <sup>2</sup>          | s.c        | -    | day1-7 |
|          |                              |            |      |        |
|          |                              |            |      |        |
|          |                              |            |      |        |
| 備考       |                              |            |      |        |

|                                       |                        |            |         |        |
|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称                                | GML200地固め第1 (MIT+BHAC) |            |         |        |
| 癌腫                                    | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数                                 | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容                              |                        |            |         |        |
| 薬剤名                                   | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン                              | 7mg/m <sup>2</sup>     | DIV        | 30分     | day1-3 |
| エノシタビン                                | 200mg/m <sup>2</sup>   | DIV        | 3時間     | day1-5 |
| 備考                                    |                        |            |         |        |
| 70歳以上でミトキサントロン5mg/m <sup>2</sup> に減量。 |                        |            |         |        |

|   |                            |            |         |        |
|---|----------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称  | GML200地固め第2 (DNR+ETP+BHAC) |            |         |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                   | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数   | -                          | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容  |                            |            |         |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                      | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン   | 30mg/m <sup>2</sup>        | DIV        | 30分     | day1-2 |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup>       | DIV        | 2時間     | day1-3 |
| エノシタピン  | 200mg/m <sup>2</sup>       | DIV        | 3時間     | day1-5 |
| 備考  |                            |            |         |        |
| 70歳以上でダウノルビシン25mg/m <sup>2</sup> 、エトポシド75mg/m <sup>2</sup> に減量。 |                            |            |         |        |

|                                       |                        |            |         |        |
|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称                                | GML200地固め第3 (ACR+BHAC) |            |         |        |
| 癌腫                                    | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数                                 | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容                              |                        |            |         |        |
| 薬剤名                                   | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アクリルピシン                               | 14mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 30分     | day1-5 |
| エノシタピン                                | 200mg/m <sup>2</sup>   | DIV        | 3時間     | day1-5 |
| 備考                                    |                        |            |         |        |
| 70歳以上でアクリルピシン10mg/m <sup>2</sup> に減量。 |                        |            |         |        |

|                                       |                        |            |         |        |
|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称                                | GML200寛解導入A (DNR+BHAC) |            |         |        |
| 癌腫                                    | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | 寛解で地固めへ |        |
| 総コース数                                 | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容                              |                        |            |         |        |
| 薬剤名                                   | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン                               | 40mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 30分     | day1-3 |
| エノシタビン                                | 200mg/m <sup>2</sup>   | DIV        | 3時間     | day1-8 |
| 備考                                    |                        |            |         |        |
| 70歳以上でダウノルビシン30mg/m <sup>2</sup> に減量。 |                        |            |         |        |
| 検査結果にてダウノルビシンとエノシタビンの追加投与あり           |                        |            |         |        |



|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第1 (MIT+AraC) 65-69歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン | 7mg/m <sup>2</sup>             | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第1 (MIT+AraC) 70-74歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン | 5mg/m <sup>2</sup>             | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第2 (DNR+AraC) 65-69歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノマイシン  | 40mg/m <sup>2</sup>            | DIV        | 30分     | day1-2 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
|          |                                |            |         |        |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第2 (DNR+AraC) 70-74歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノマイシン  | 30mg/m <sup>2</sup>            | DIV        | 30分     | day1-2 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第3 (ACR+AraC) 65-69歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アクリシノン   | 16mg/m <sup>2</sup>            | DIV        | 30分     | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                                |            |         |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219地固め第3 (ACR+AraC) 70-74歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                       | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                              | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                                |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                          | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アクリルピシン  | 14mg/m <sup>2</sup>            | DIV        | 30分     | day1-5 |
| シタラビン    | 100mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-5 |
|          |                                |            |         |        |
| 備考       |                                |            |         |        |

|          |                               |            |         |        |
|----------|-------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219寛解導入 (DNR+AraC) 65-69歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                      | 1コース期間     | 寛解で地固めへ |        |
| 総コース数    | -                             | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                               |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                         | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン  | 45mg/m <sup>2</sup>           | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-7 |
| 備考       |                               |            |         |        |

|          |                               |            |         |        |
|----------|-------------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | GML219寛解導入 (DNR+AraC) 70-74歳用 |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病                      | 1コース期間     | 寛解で地固めへ |        |
| 総コース数    | -                             | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                               |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                         | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ダウノルビシン  | 35mg/m <sup>2</sup>           | DIV        | 30分     | day1-3 |
| シタラビン    | 50mg/m <sup>2</sup> ×2        | DIV        | 12時間    | day1-7 |
|          |                               |            |         |        |
| 備考       |                               |            |         |        |



| レジメン名称   | 低用量シタラビン + ベネトクラクス  |            |      |         |
|--|---------------------|------------|------|---------|
| 癌腫   | 急性骨髄性白血病            | 1コース期間     | 28日間 |         |
| 総コース数  | 期限なし                | プレメディケーション | -    |         |
| プロトコール内容   |                     |            |      |         |
| 薬剤名  | 1日投与量               | 投与方法       | 投与時間 | 投与日     |
| シタラビン  | 20mg/m <sup>2</sup> | s.c        | -    | day1-10 |
| ベネトクラクス  | 100mg/day           | p.o        |      | day1    |
|  | 200mg/day           | p.o        |      | day2    |
|  | 400mg/day           | p.o        |      | day3    |
|  | 600mg/day           | p.o        |      | day4-   |
| 備考   |                     |            |      |         |
| ベネトクラクスは併用薬に応じて減量(強いCYP3A阻害薬1/8、中程度CYP3A阻害薬1/2)<br>投与期間を短縮する場合あり |                     |            |      |         |

| レジメン名称   | キザルチニブ単独                  |            |      |         |
|--|---------------------------|------------|------|---------|
| 癌腫   | FLT3-ITD変異陽性の<br>急性骨髄性白血病 | 1コース期間     | -    |         |
| 総コース数  | -                         | プレメディケーション | -    |         |
| プロトコール内容   |                           |            |      |         |
| 薬剤名  | 1日投与量                     | 投与方法       | 投与時間 | 投与日     |
| キザルチニブ塩酸塩  | 26.5mg×1                  | 経口         | -    | day1-14 |
| キザルチニブ塩酸塩  | 53mg×1                    | 経口         | -    | day15-  |
| 備考<br>強いCYP3A阻害剤と併用する場合は、減量基準を参考に1段階減量。併用終了後は減量前の投与量に戻すこと。 |                           |            |      |         |

|                                   |                          |            |      |       |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|------|-------|
| レジメン名称                            | ギルテリチニブ単独                |            |      |       |
| 癌腫                                | FLT3遺伝子変異陽性の<br>急性骨髄性白血病 | 1コース期間     | -    |       |
| 総コース数                             | -                        | プレメディケーション | -    |       |
| プロトコール内容                          |                          |            |      |       |
| 薬剤名                               | 1日投与量                    | 投与方法       | 投与時間 | 投与日   |
| ギルテリチニブフマル酸塩                      | 120mg×1                  | 経口         | -    | day1- |
| 備考                                |                          |            |      |       |
| 患者の状態により適宜増減するが、1日1回200mgを越えないこと。 |                          |            |      |       |

|  |                        |            |         |         |
|--|------------------------|------------|---------|---------|
| レジメン名称                                       | 再発難治CAG (ACR+AraC)     |            |         |         |
| 癌腫   | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | -       |         |
| 総コース数  | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |         |
| プロトコール内容                                     |                        |            |         |         |
| 薬剤名  | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日     |
| アクリルピシン                                      | 14mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 30分     | day1-4  |
| シタラビン  | 10mg/m <sup>2</sup> ×2 | S.C        | -       | day1-14 |
| フィルグラスチム                                     | 75μg                   | S.C        | -       | day1-14 |
| 備考<br>アクリルピシンは70歳以上で10mg/m <sup>2</sup> に減量。 |                        |            |         |         |

|                |                    |            |              |         |
|----------------|--------------------|------------|--------------|---------|
| レジメン名称         | 再発難治GO             |            |              |         |
| 癌腫             | 急性骨髄性白血病           | 1コース期間     | -            |         |
| 総コース数          | 1コース (2回)          | プレメディケーション | ソルコーテフ、ボララミン |         |
| プロトコール内容       |                    |            |              |         |
| 薬剤名            | 1日投与量              | 投与方法       | 投与時間         | 投与日     |
| ゲムツズマブ オゾガマイシン | 9mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 2時間          | day1.15 |
|                |                    |            |              |         |
| 備考             |                    |            |              |         |

|   |                          |            |                |        |
|---|--------------------------|------------|----------------|--------|
| レジメン名称  | 再発難治HAM【ステロイド前処置】        |            |                |        |
| 癌腫  | 急性骨髄性白血病                 | 1コース期間     | -              |        |
| 総コース数   | -                        | プレメディケーション | グラニセトロン、ソルコーテフ |        |
| プロトコール内容  |                          |            |                |        |
| 薬剤名   | 1日投与量                    | 投与方法       | 投与時間           | 投与日    |
| シタラビン   | 2000mg/m <sup>2</sup> ×2 | DIV        | 3時間            | day1-4 |
| ミトキサントロン  | 10mg/m <sup>2</sup>      | DIV        | 30分            | day3-5 |
| 備考 day1-4はグラニセトロン×2<br>60歳以上はシタラビン1500mg/m <sup>2</sup> に減量、ミトキサントロンは12mg/m <sup>2</sup> に減量の場合あり<br>結膜炎予防でマイティア点眼、フルオロメトロン点眼0.02%使用。 |                          |            |                |        |

|  |                       |            |         |        |
|--|-----------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | 再発難治HAM               |            |         |        |
| 癌腫   | 急性骨髄性白血病              | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数  | -                     | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容   |                       |            |         |        |
| 薬剤名  | 1日投与量                 | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 3時間     | day1-4 |
| シタラビン  | 2000mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 3時間     | day1-4 |
| ミトキサントロン   | 10mg/m <sup>2</sup>   | DIV        | 30分     | day3-5 |
| 備考   |                       |            |         |        |
| 60歳以上はシタラビン1500mg/m <sup>2</sup> に減量、ミトキサントロンは12mg/m <sup>2</sup> に減量の場合あり<br>結膜炎予防でマイティア点眼、フルオロメトロン点眼0.02%使用。 |                       |            |         |        |

| レジメン名称                 | 再発難治MEC                |            |         |        |
|------------------------|------------------------|------------|---------|--------|
| 癌腫                     | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数                  | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容               |                        |            |         |        |
| 薬剤名                    | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン               | 6mg/m <sup>2</sup>     | DIV        | 30分     | day1-5 |
| エトポシド                  | 80mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 2時間     | day1-7 |
| シタラビン                  | 50mg/m <sup>2</sup> ×2 | DIV        | 各12時間   | day1-7 |
| 備考<br>エトポシド、濃度による析出注意。 |                        |            |         |        |



|                        |                        |            |         |        |
|------------------------|------------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称                 | 再発難治shortMEC           |            |         |        |
| 癌腫                     | 急性骨髄性白血病               | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数                  | -                      | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容               |                        |            |         |        |
| 薬剤名                    | 1日投与量                  | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| ミトキサントロン               | 6mg/m <sup>2</sup>     | DIV        | 30分     | day1-3 |
| エトポシド                  | 80mg/m <sup>2</sup>    | DIV        | 2時間     | day1-5 |
| シタラビン                  | 50mg/m <sup>2</sup> ×2 | DIV        | 各12時間   | day1-5 |
| 備考<br>エトポシド、濃度による析出注意。 |                        |            |         |        |

|          |                      |            |         |        |
|----------|----------------------|------------|---------|--------|
| レジメン名称   | 移植後再発 (ACR+BHAC)     |            |         |        |
| 癌腫       | 急性骨髄性白血病             | 1コース期間     | -       |        |
| 総コース数    | -                    | プレメディケーション | グラニセトロン |        |
| プロトコール内容 |                      |            |         |        |
| 薬剤名      | 1日投与量                | 投与方法       | 投与時間    | 投与日    |
| アクリルビン   | 14mg/m <sup>2</sup>  | DIV        | 30分     | day1-7 |
| エノシタビン   | 200mg/m <sup>2</sup> | DIV        | 3時間     | day1-7 |
|          |                      |            |         |        |
| 備考       |                      |            |         |        |