

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10min	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10min	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10min	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	div	10min	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	—	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	-	day1-5
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	—	day1-7
備考				

レジメン名称	アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし）			
癌腫	骨髄異形成症候群	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	s.c	-	day1-7
備考				