レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（1サイクル目）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	21~28日間
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスポンサ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day1.8.15

備考

ベスポンサ投与時、要遮光

HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（寛解　2～6サイクル目）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	28日間
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスポンサ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day1.8.15

備考

ベスポンサ投与時、要遮光

HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（非寛解　2～6サイクル目）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	28日間
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベスポンサ	0.8mg/m2	div	60分以上かけて	day1
ベスポンサ	0.5mg/m2	div	60分以上かけて	day8.15

備考

ベスポンサ投与時、要遮光

HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg以上）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	18μg/body	div	48時間	day1.3.5
ブリナツモマブ	18μg/body	div	24時間	day7
ブリナツモマブ	28μg/body	div	24時間	day8-28

備考

28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、

その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg未満）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	10μg/m2	div	48時間	day1.3.5
ブリナツモマブ	10μg/m2	div	24時間	day7
ブリナツモマブ	15μg/m2	div	24時間	day8-28

備考

28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、

その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（2~5サイクル目 45kg以上）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	28μg/body	div	24時間	day1-28

備考

28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、

その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（2~5サイクル目 45kg未満）		
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	15μg/m2	div	24時間	day1-28

備考

28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、

その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル