レジメン名称	ゲムシタビン＋シスプラチン（GC）				
癌腫	胆道癌		1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	25mg/㎡		DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/㎡		DIV	30分	day1,8
備考 入院の場合、day3までハイドレーションあり。					

レジメン名称	ゲムシタビン			
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、（デキサメタゾン）	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	ゲムシタビン＋エスワン（2投1休）		
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、（デキサメタゾン）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1～14

備考

レジメン名称	ゲムシタビン＋エスワン（3投1休）		
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、（デキサメタゾン）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8,15
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1～14

備考

レジメン名称	ゲムシタビン＋シスプラチン＋エスワン（GCS)			
癌腫	胆道癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	25mg/㎡	DIV	60分	day1
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1~7

備考

入院の場合、day3までハイドレーションあり。

レジメン名称	イボシデニブ		
癌腫	胆道がん	1コース期間	－
総コース数	期限なし	プレメディケーション	－

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ティブソボ	500mg/body	PO	－	連日

備考
高脂肪食摂取前後の投与を避ける
強いＣＹＰ３Ａ阻害剤と併用する場合には、本剤の１回用量を２５０ｍｇに減量

レジメン名称	デュルバルマブ+ゲムシタビン＋シスプラチン		
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	DIV	60分	day1
シスプラチン	25mg/㎡	DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8

備考

入院の場合、day3までハイドレーションあり。

レジメン名称	デュルバルマブ維持療法		
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ＋ゲムシタビン＋シスプラチン		
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	25mg/㎡	DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ＋ゲムシタビン維持療法		
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1,8

備考

キイトルーダ＋ゲムシタビン＋シスプラチン療法の9サイクル目以降から使用。キイトルーダは最大35サイクルまで。