レジメン名称	CHASE療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンドキサン	1200mg/m2	div	180分	day1
エトポシド	100mg/m2	div	120分	day1-3
シタラビン	2000mg/m2	div	180分	day2-3
デキサート	40mg/body	div	30分	day1-3

備考

シタラビンによる結膜炎予防としてフルオロメトロン点眼0.02%、マイティア使用

レジメン名称	CHASE療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンドキサン	1200mg/m2	div	180分	day1
エトポシド	100mg/m2	div	120分	day1-3
シタラビン	2000mg/m2	div	180分	day2-3
デキサート	40mg/body	div	30分	day1-3

備考

シタラビンによる結膜炎予防としてフルオロメトロン点眼0.02%、マイティア使用

レジメン名称	CHOP療法			
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間	
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day1
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o./div	-	day1-5
備考				

レジメン名称	CVP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21-28日間
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	－

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day1
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
プレドニン	40mg/m2	po	－	day1-5

備考

レジメン名称	DeVIC療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	6コース	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	300mg/m2	div	60分	day1
エトポシド	100mg/m2	div	120分	day1-3
イホマイド	1500mg/m2	div	120分	day1-3
デキサート	40mg/body	div	30分	day1-3

備考

レジメン名称	EPOCH療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エトポシド	50mg/m2	div	24時間	day1-4
オンコビン	0.4mg/m2	div	24時間	day1-4
ドキソルビシン	10mg/m2	div	24時間	day1-4
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day5
プレドニン	60mg/m2	po	ー	day1-5

備考

オンコビンは持続のため調製後遮光。

レジメン名称	ESHAP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21-28日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シタラビン	2000mg/m2	div	180分	day5
シスプラチン	25mg/m2	div	24時間	day1-4
ソル・メドロール	500mg/body	div	30分	day1-5

備考

シタラビンによる結膜炎予防としてフルオロメトロン点眼0.02%、マイティア使用

レジメン名称	G-Bendamustine療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1.8.15
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day1.2

備考

ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	G-Bendamustine療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day1.2

備考

ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	G-CHOP療法【1サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1.8.15
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day1
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o	-	day1.2-5

備考
ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	G-CHOP療法【2-6サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day1
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o	-	day1.2-5

備考
ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	G-CHOP療法【7-8サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1

備考
ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	G-CVP療法（1サイクル目）		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1.8.15
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o./div	-	day1-5

備考

ガザイバ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	G-CVP療法（2-8サイクル目）		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o./div	-	day1-5

備考

ガザイバ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	GDP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサート グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	div	30分	day1.8
シスプラチン	75mg/m2	div	60分	day1
デカドロン	20mg	po	ー	day1
デカドロン	40mg	po	ー	day2-4

備考

シスプラチンによる腎障害予防で、ハイドレーション実施

レジメン名称	Mosun(SC)-Pola療法【1サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ポラツズマブベドチン　最大6コース モスネツズマブ　最大８コース	プレメディケーション	カロナール、ポララミン デカドロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ポライビー	1.8mg/kg	div	90分	day1
ルンスミオ	5mg/body	sc	30秒～2分	day1
	45mg/body			day8.15

備考
day1　ポライビー投与30分前にカロナール、ポララミン、デカドロン投与
day8,15　ルンスミオ投与30分前にカロナール、ポララミン、デカドロン投与

レジメン名称	Mosun(SC)-Pola療法【2～6サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ポラツズマブベドチン　最大6コース モスネツズマブ　最大８コース	プレメディケーション	カロナール、ポララミン デカドロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ポライビー	1.8mg/kg	div	初回忍容性良好 であれば30分	day1
ルンスミオ	45mg/body	sc	30秒～2分	day1

備考
ポライビー投与30分前にカロナール、ポララミン、デカドロン投与

レジメン名称	Mosun(SC)-Pola療法【7～8サイクル目】				
癌腫	非ホジキンリンパ腫		1コース期間	21日間	
総コース数	ポラツズマブベドチン　最大6コース モスネツズマブ　最大８コース		プレメディケーション	カロナール、ポララミン デカドロン	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
ルンスミオ	45mg/body		sc	30秒～2分	day1
備考 ルンスミオ投与30分前にカロナール、ポララミン、デカドロン投与					

レジメン名称	Pola-BR療法（1サイクル目）		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	最大6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ポライビー	1.8mg/kg	div	90分	day2
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day2.3

備考

リツキシマブとポライビー投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	Pola-BR療法（2-6サイクル目）		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	最大6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート カロナール、ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ポライビー	1.8mg/kg	div	90分	day1
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day1.2

備考

リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	Pola-R-CHP療法【1サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day2
ポライビー	1.8mg/kg	div	90分	day2
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day2
プレドニン	100mg/day	p.o	-	day2-6

備考
day1、リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン投与
day2、ポライビー投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	Pola-R-CHP療法【2-6サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day1
ポライビー	1.8mg/kg	div	90分	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	60分	day1
プレドニン	100mg/day	p.o	-	day1-5

備考
day1、リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン投与
day2、ポライビー投与30分前にカロナール、ポララミン投与
※ ポライビー初回忍容性良好なら2回目移行30分に短縮可

レジメン名称	R2療法【1サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	リツキシマブは5サイクル目まで 最大12サイクル (6-12サイクルはレブラミドのみ)	プレメディケーション	カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1.8.15.22
レブラミド	20mg/body	p.o	-	day1-21

備考

リツキシマブ投与30分間にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	R2療法【2-5サイクル目】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	リツキシマブは5サイクル目まで 最大12サイクル (6-12サイクルはレブラミドのみ)	プレメディケーション	カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
レブラミド	20mg/body	p.o	-	day1-21

備考

リツキシマブ投与30分間にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	R-Bendamustine療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	最大6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day1.2

備考

リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	R-Bendamustine療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	最大6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ベンダムスチン	90mg/m2	div	60分	day2.3

備考

リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	R-Bendamustine療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	最大6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ベンダムスチン	120mg/m2	div	60分	day2.3

備考

リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	R-CHASE療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
エンドキサン	1200mg/m2	div	180分	day2-3
エトポシド	100mg/m2	div	120分	day2-4
シタラビン	2000mg/m2	div	180分	day3-4
デキサート	40mg/body	div	30分	day2-4

備考

シタラビンによる結膜炎予防としてフルオロメトロン点眼0.02%、マイティア使用

レジメン名称	R-CHOP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day2
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day2
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day2
プレドニン	100mg/day	p.o./div	-	day2-6

備考

リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	R-CVP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21-28日間
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day2
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day2
プレドニン	40mg/m2	po	－	day2-6
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1

備考

リツキシマブ投与30分間にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	R-EPOCH療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
エトポシド	50mg/m2	div	24時間	day2-5
オンコビン	0.4mg/m2	div	24時間	day2-5
ドキソルビシン	10mg/m2	div	24時間	day2-5
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day6
プレドニン	60mg/m2	po	ー	day2-6

備考
オンコビンは持続のため調製後遮光。
リツキシマブ投与30分間にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	R-ESHAP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21-28日間
総コース数	ー	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シタラビン	2000mg/m2	div	180分	day6
シスプラチン	25mg/m2	div	24時間	day2-5
ソル・メドロール	500mg/body	div	30分	day2-6
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1

備考

シタラビンによる結膜炎予防としてフルオロメトロン点眼0.02%、マイティア使用

リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	R-HDMTX療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	14日間
総コース数	–	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
メソトレキセート	3.5g/m2	div	180分	day2

備考
リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン投与

レジメン名称	R-MPV療法		
癌腫	中枢神経系原発 悪性リンパ腫	1コース期間	14日間
総コース数	5-7コース	プレメディケーション	パロノセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
メソトレキセート	3500mg/m2	div	180分	day2-3
オンコビン	1.4mg/m2	iv	緩徐に	day2
プロカルバジン	100mg/m2	po	ー	day1-7

備考　リツキシマブ投与30分前に、カロナール、ポララミン内服。オンコビン max 2mg
プロカルバジンは奇数コースに投与。メソトレキセート1.5＜Cr≦2.0：25％減量・2.0＜Cr：治療の延期
中和目的でロイコボリン使用

レジメン名称	R-THP-COP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
テラルビシン	30mg/m2	div	30分	day2
オンコビン	1mg/m2	iv	緩徐に	day2
エンドキサン	500mg/m2	div	180分	day2
プレドニン	30mg/m2	div/po	－	day2-6

備考

オンコビン max 2mg、リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	THP-COP療法			
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間	
総コース数	6～８コース	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テラルビシン	30mg/m2	div	30分	day1
オンコビン	1mg/m2	iv	緩徐に	day1
エンドキサン	500mg/m2	div	180分	day1
プレドニン	30mg/m2	div/po	ー	day1-5
備考 オンコビン max 2mg				

レジメン名称	VR-CAP療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	4-6コース	プレメディケーション	グラニセトロン、カロナール ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m2	s.c	－	day1.4.8.11
ドキソルビシン	50mg/m2	div	30分	day1
エンドキサン	750mg/m2	div	180分	day1
プレドニン	100mg/day	po	－	day1-5

備考

リツキシマブ投与30分前にポララミン、カロナール内服

レジメン名称	エプコリタマブ療法【1サイクル目】		
癌腫	大細胞型B細胞リンパ腫	1コース期間	28日
総コース数	PDまで	プレメディケーション	カロナール、ポララミン、プレドニン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エプキンリ	0.16mg/body	s.c	-	day1
エプキンリ	0.8mg/body	s.c	-	day8
エプキンリ	48mg/body	s.c	-	day15.22

備考 CRS軽減目的にエプキンリ投与30分前にカロナール(700mg)、ポララミン(2mg)、プレドニン(100mg)を内服する。Day2-4.9-11.16-18.23-25のプレドニンは100mg内服する。
CRS及びTLSを予防するために投与時は補液等を用いて水分補給を行う。

レジメン名称	エプコリタマブ療法【2-3サイクル目】		
癌腫	大細胞型B細胞リンパ腫	1コース期間	28日
総コース数	PDまで	プレメディケーション	前回投与後にCRSが出現しなかった場合は前投薬不要

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エプキンリ	48mg/body	s.c	-	day1.8.15.22

備考　★前回投与後にgrade2又は3のCRSが出現した場合★
エプキンリ投与後にgrade2以上のCRSが出現しなくなるまで、投与30分前にプレドニン100mgと2-4日目のプレドニン100mgの投与を継続する(day8以降も同様)
CRS及び、TLSを予防するために投与時は補液等を用いて水分補給を行う。

レジメン名称	エプコリタマブ療法【4-9サイクル目】		
癌腫	大細胞型B細胞リンパ腫	1コース期間	28日
総コース数	PDまで	プレメディケーション	前回投与後にCRSが出現しなかった場合は前投薬不要

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エプキンリ	48mg/body	s.c	-	day1.15

備考　★前回投与後にgrade2又は3のCRSが出現した場合★
エプキンリ投与後にgrade2以上のCRSが出現しなくなるまで、投与30分前にプレドニン100mgと2-4日目のプレドニン100mgの投与を継続する(day8以降も同様)
CRS及び、TLSを予防するために投与時は補液等を用いて水分補給を行う。

レジメン名称	エプコリタマブ療法【10サイクル目以降】		
癌腫	大細胞型B細胞リンパ腫	1コース期間	28日
総コース数	PDまで	プレメディケーション	前回投与後にCRSが出現しなかった場合は前投薬不要

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エプキンリ	48mg/body	s.c	-	day1

備考　★前回投与後にgrade2又は3のCRSが出現した場合★
エプキンリ投与後にgrade2以上のCRSが出現しなくなるまで、投与30分前にプレドニン100mgと2-4日目のプレドニン100mgの投与を継続する(day8以降も同様)
CRS及び、TLSを予防するために投与時は補液等を用いて水分補給を行う。

レジメン名称	オビヌツズマブ維持療法				
癌腫	非ホジキンリンパ腫		1コース期間	2ヶ月	
総コース数	12コース		プレメディケーション	デキサート、カロナール ポララミン	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	
ガザイバ	1000mg/body	div	適宜	day1	
備考 ガザイバ投与30分前にカロナール、ポララミン、デキサート投与					

レジメン名称	ダリナパルシン療法		
癌腫	末梢性T細胞リンパ腫	1コース期間	21日
総コース数	臨床試験では6サイクルを基本 必要時7サイクル以上継続	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ダルビアス	300mg/m2	div	60分	day1-5

備考

レジメン名称	デニロイキン ジフチトクス療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間
総コース数	最大８コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサート ポララミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レミトロ	9μg/kg	div	60分	day1-5

備考

レミトロ投与30分前にカロナール内服

毛細血管漏出症候群を軽減する目的で、投与前後生食250mLをそれぞれ投与

レジメン名称	フォロデシン単独		
癌腫	再発又は難治性の 末梢性T細胞リンパ腫	1コース期間	－
総コース数	－	プレメディケーション	－

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ムンデシン	300mg×2	経口	－	day1-

備考

レジメン名称	リツキシマブ維持療法		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	8週間隔
総コース数	最大12回	プレメディケーション	カロナール、ポララミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
リツキシマブ	375mg/m2	div	適宜	day1

備考

リツキシマブ投与30分間にカロナール、ポララミン内服

レジメン名称	ロミデプシン療法 【グラニセトロン】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	PDまで	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イストダックス	14mg/m2	div	240分	day1.8.15

備考

レジメン名称	ロミデプシン療法 【パロノセトロン】		
癌腫	非ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間
総コース数	PDまで	プレメディケーション	パロノセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イストダックス	14mg/m2	div	240分	day1.8.15

備考