| レジメン名称 | アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | div | 10分 | day1-5 |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（点滴）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | － |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | div | 10分 | day1-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | div | 10分 | day1-7 |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（点滴）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | － |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | div | 10分 | day1-7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬あり） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | s.c | － | day1-5 |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（皮下注）【5日間】（5-HT3拮抗薬なし） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | － |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | s.c | － | day1-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬あり） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | s.c | － | day1-7 |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | アザシチジン（皮下注）【7日間】（5-HT3拮抗薬なし） | | |
|---|---|---|---|
| 癌腫 | 骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | － |

プロトコール内容

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
|---|---|---|---|---|
| アザシチジン | 75mg/㎡ | s.c | － | day1-7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| レジメン名称 | レナリドミド単独 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 癌腫 | 5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群 | 1コース期間 | 28日間 | |
| 総コース数 | PD(増悪)まで | プレメディケーション | ー | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 |
| レブラミド | 10mg×1 | 経口 | ー | day1-21 |
| | | | | |
| 備考<br>高脂肪食摂取後の投与によってAUC及びCmaxの低下が認められることから、高脂肪食摂取前後を避けて投与することが望ましい。3週間内服し7日間休薬。妊娠回避の徹底。 | | | | |